

# QUESTIONARIO

# 1


## **REGIONE ABRUZZO AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 2 Collaboratori Professionali Sanitari - Personale Infermieristico - OSTETRICA - cat. "D"

### **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova

#### **VERSIONE QUESTIONARIO**



**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**



# Questionario 01000009

**1. Quali indagini sono possibili con l'amniocentesi?**

- A. indagini citogenetiche per la diagnosi di anomalie cromosomiche e di sesso per le malattie legate al cromosoma X
- B. indagini sulla coagulazione materna
- C. indagini sulla predisposizione materna ad un parto prematuro
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**2. La vaginosi batterica può essere responsabile di complicanze ostetriche quali:**

- A. pPROM
- B. parto pretermine
- C. endometrite post partum
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**3. In gravidanza aumenta sensibilmente il fabbisogno di:**

- A. proteine
- B. carboidrati
- C. grassi
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**4. Il prelievo dei villi coriali viene riservato a:**

- A. donne con più alto rischio di sviluppare un diabete gestazionale
- B. donne con più alto rischio di anomalie cromosomiche o malattie geniche
- C. donne con più alto rischio di sviluppare la preeclampsia
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**5. Quale tra queste potrebbe essere una complicanza della villocentesi:**

- A. aumento della pressione arteriosa materna
- B. corioamnionite
- C. aumento del BMI materno
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**6. Quali tra le seguenti affermazioni riguardanti il test combinato non è corretta:**

- A. comprende translucenza nucleare, hCG, proteina plasmatica A associata alla gravidanza (PAPP-A)
- B. deve essere eseguito tra 11+0 settimane e 13+6 settimane
- C. la misurazione della translucenza nucleare da sola è raccomandata per individuare la sindrome di Down
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**7. I "segni di probabilità" per l'identificazione di una gravidanza:**

- A. si riscontrano al di fuori dell'apparato genitale
- B. si riscontrano a livello dell'apparato genitale
- C. sono direttamente collegati alla presenza dell'embrione/feto
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**8. L'attività fisica in una gravidanza fisiologica:**

- A. deve essere intensa
- B. non deve comportare rischi di cadute
- C. sonomesse le immersioni subacquee
- D. tutte le risposte sono corrette

**9. L'atosiban è:**

- A. un calcio antagonista
- B. un derivato alcaloide della segale cornuta
- C. un antagonista recettoriale dell'ossitocina
- D. un anticoagulante

**10. La gonadotropina corionica raggiunge il massimo delle concentrazioni plasmatiche :**

- A. alla 6 W
- B. tra la 8W e la 12W
- C. intorno alla 25 W
- D. tra la 20W e la 30W

**11. Un'aumentata concentrazione di HCG è associata tutte le seguenti condizioni, tranne:**

- A. corioncarcinoma
- B. iperemesi gravidica
- C. carcinoma ovarico
- D. mola vescicolare

**12. Il fibrinogeno in gravidanza:**

- A. aumenta
- B. diminuisce
- C. rimane invariato
- D. dipende dall'età

**13. Quale tra queste è un'indicazione alla villocentesi?**

- A. età materna superiore ai 35 anni
- B. diabete pregravico insulino-dipendente
- C. BMI superiore a 30
- D. partner iperteso

**14. L'ipossiemia fetale è:**

- A. la riduzione dell'ossigeno negli organi periferici a seguito di un processo di centralizzazione del flusso
- B. la fase iniziale del ridotto apporto di ossigeno con ridotta saturazione di ossigeno nel sangue arterioso
- C. la riduzione dell'ossigeno a livello degli organi centrali
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**15. In caso di distocia di spalla quale manovra porta il diametro bisacromiale, posto in anteroposteriore, lungo il diametro obliquo?**

- A. manovra di Zavanelli
- B. manovra di Jacqemier
- C. manovra di Zavanelli
- D. manovra di Rubin2

**16. L'immersione in acqua durante il travaglio/parto:**

- A. aumenta il rischio di ricovero del neonato in TIN
- B. aumenta il rischio di morte materna
- C. aumenta il rischio di ricorrere ad un taglio cesareo
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**17. Qual'è la frattura di più frequente riscontro nel neonato:**

- A. omero
- B. clavicola
- C. femore
- D. cranio

**18. L'unico intervento preventivo di provata efficacia per ridurre il rischio della SIDS è?**

- A. posticipare al sesto mese la somministrazione delle vaccinazioni
- B. mettere il bambino in posizione supina per farlo dormire
- C. mettere il bambino in posizione prona per il sonno
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**19. Cosa si intende per SIDS:**

- A. Systematic Infant Death Syndrome
- B. Sudden Infantility Death Syndrome
- C. Sudden Infant Death Syndrome
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**20. Quale tra questi non è un fattore di rischio per rottura d'utero?**

- A. pregressa chirurgia uterina
- B. uso della manovra di Kristeller
- C. la somministrazione di tocolitici
- D. la presentazione anomala

**21. Quali tra questi è un "fenomeno plastico" del parto?**

- A. distensione della vagina e del perineo
- B. progressione
- C. formazione della borsa amniocoriale
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**22. I segni di rottura d'utero intrapartum non includono:**

- A. risalita del livello della parte presentata
- B. bradicardia materna
- C. anello di Bandl patologico
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**23. Durante il travaglio/parto in acqua la donna:**

- A. deve rimanere in acqua il più possibile
- B. deve evitare di bere ed idratarsi
- C. deve restare immobile
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**24. La tecnica di alimentazione che viene maggiormente utilizzata quando il neonato non è in grado di assumere latte è:**

- A. la nutrizione parenterale
- B. l'infusione endovenosa
- C. il gavage
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**25. Nella presentazione di vertice qual è il diametro di impegno?**

- A. occipito-frontale
- B. mento-occipitale
- C. sottoccipito-bregmatico
- D. bisacromiale

**26. La lunghezza media di un neonato è:**

- A. 35cm
- B. 40cm
- C. 50cm
- D. 55cm

**27. La manovra di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree può essere utilizzata:**

- A. in tutti i casi di ostruzione delle vie aeree
- B. solo nei lattanti
- C. nei bambini dopo l'anno di vita
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**28. Quale ormone è responsabile dell'arresto del travaglio in acqua?**

- A. ossitocina
- B. progesterone
- C. vasopressina
- D. endorfine

**29. La "situazione" esprime il rapporto tra il maggiore asse fetale con:**

- A. il minore asse della cavità uterina
- B. lo stretto superiore
- C. il maggiore asse della cavità uterina
- D. lo stretto inferiore

**30. Il termine "uncinamento" a quale condizione ostetrica è riconducibile?**

- A. parto cefalico
- B. distocia di spalle
- C. parto gemellare
- D. parto podalico

**31. Durante il travaglio parto la donna ha diritto di avere accanto a se:**

- A. il partner
- B. un familiare
- C. una persona di sua scelta,familiare o non
- D. due persone

**32. Quale tra questi non è un criterio di inclusione al travaglio e parto in acqua?**

- A. travaglio attivo
- B. CTG rassicurante
- C. nessuna complicanza medico-ostetrica
- D. iperplessia materna

**33. Il diabete gestazionale è correlato a rischi materni quali:**

- A. aumento rischio di diabete tipo 2
- B. ipertensione
- C. tutte le altre risposte sono corrette
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**34. I nervi ipogastrici che innervano la vescica provengono da:**

- A. T10 - L2
- B. T12 - L2
- C. T10
- D. L2

**35. Quanti dosaggi di glicemia si fanno nell'OGTT 75 mg?**

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 1

**36. La prescrizione della curva da carico di glucosio a 16-18 settimane è raccomandata in caso di :**

- A. GDM in una gravidanza precedente
- B. BMI  $\geq$  25
- C. diabete in familiari di I grado
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**37. Quali tra i seguenti è un fattore di alto rischio per la preeclampsia:**

- A. precedente preeclampsia
- B. diabete mellito preesistente
- C. sindrome da anticorpi antifosfolipidi
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**38. Quali dei seguenti rischi materni è aumentato nella gravidanza gemellare?**

- A. diabete gestazionale
- B. bassi livelli di alfa fetoproteina sierica nella madre
- C. ipertensione indotta dalla gravidanza
- D. infezione delle vie urinarie

**39. Cosa si intende per difetto ipertensivo da camice bianco ?**

- A. definito come la condizione in cui i valori pressori sono  $\geq$  140/90 mmHg quando rilevati in setting sanitari
- B. definito come la condizione in cui i valori pressori sono  $\geq$  130/90 mmHg quando rilevati in setting sanitari
- C. definito come la condizione in cui i valori pressori sono  $\geq$  135/90 mmHg quando rilevati in setting sanitari
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**40. Il trattamento primario del carcinoma endometriale stadio II prende in considerazione in :**

- A. terapia radiante esterna
- B. radium intracavitario
- C. isterectomia ed annessiectomia bilaterale
- D. chemioterapia neoadiuvante

**41. In caso di attacco eclamptico cosa si rende necessario fare?**

- A. taglio cesareo d'urgenza
- B. espletamento del parto indipendentemente dalla metodica
- C. stabilizzare le condizioni della donna e del feto
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**42. Quali tra se seguenti affermazioni sul trattamento con MgSO<sub>4</sub> e' corretta:**

- A. il trattamento va continuato per 48 ore
- B. il trattamento non può essere ripetuto se compaiono nuove indicazioni
- C. se il trattamento è terminato da sole 6-8 ore non si deve ripetere il carico iniziale ma si somministra MgSO<sub>4</sub> secondo lo schema di mantenimento
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**43. Secondo AIPE (2013) i valori pressori che fanno propendere per una diagnosi di ipertensione in gravidanza**

- A.  $\geq$  140/90 mmHg
- B. 140/90 mmHg
- C. 135/85 mmHg
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**44. Tra le seguenti opzioni qual è la causa più frequente di distacco intempestivo di placenta?**

- A. eventi traumatici
- B. rottura dell'arteria deciduale materna da ipertensione
- C. brevità di funicolo
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**45. Il detrusore è innervato dai nervi:**

- A. ipogastrici
- B. pelvici
- C. ipogastrici e pelvici
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**46. La curva da carico di glucosio (OGTT) è raccomandata a 26-28 W se:**

- A. BMI tra 25 e 30
- B. anamnesi familiare negativa per diabete
- C. è una primigravida senza fattori di rischio
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**47. Con quale normativa dello Stato sono stati istituiti i Consultori Familiari in Italia?**

- A. D.Lgs.502/1992
- B. L. n. 405/1975
- C. D.Lgs 517/1993
- D. L.833/1978

**48. Il percorso Nascita fa parte dei programmi strategici di:**

- A. Progetto Obiettivo ASL
- B. Progetto Obiettivi di budget della propria U.O.
- C. Progetto Obiettivo Materno Infantil
- D. Progetto obiettivo correlato ai LEA

**49. Le pene a norma dell'articolo 622 del Codice Penale, sono previste nel caso in cui:**

- A. chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna
- B. chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza
- C. chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro
- D. chiunque, venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità di chi ha fatto ricorso alle procedure previste dalla L.194/78

**50. In riferimento alla L. 34/1996 si esplicita la necessità di un consultorio ogni:**

- A. 20.000 abitanti
- B. 30.000 abitanti
- C. 10.000 abitanti
- D. 5.000 abitanti

