

# QUESTIONARIO

# 4


## **REGIONE ABRUZZO AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - TERAMO**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di  
2 Collaboratori Professionali Sanitari - Personale  
Infermieristico - OSTETRICA - cat. "D"

### **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova

#### **VERSIONE QUESTIONARIO**



**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**



# Questionario 04000006

**1. La misurazione della translucenza nucale è ottimale tra:**

- A. prima della 9 W
- B. tra la 9 e 11 W
- C. tra la 11 e la 13-6 W
- D. dopo la 14 W

**2. I rischi fetali non legati alla placenta previa sono:**

- A. emorragia post partum
- B. parto pretermine
- C. IUGR
- D. morte intrauterina

**3. La datazione della gravidanza va corretta:**

- A. in corso di gravidanza se c'è un gap con i valori biometrici
- B. nel III trimestre se il gap con i dati ecografici è uguale o > di 1 settimna
- C. nel I trimestre se il gap con i dati ecografici è < di 1 settimna
- D. nel I trimestre se il gap con i dati ecografici è uguale o > di 1 settimna

**4. Che cos'è il corpo albicante?**

- A. leucorrea da candida albicans
- B. cristallizzazione del muco cervicale
- C. esito cicatriziale del corpo luteo
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**5. Si parla di oligoamnios quando l'AFI è:**

- A. < 3
- B. <5
- C. Tra 5 e 8
- D. >5

**6. L'atosiban è contrindicato se:**

- A. EG < 24 settimane
- B. EG > 33 settimane
- C. PROM oltre la 30 settimana
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**7. Secondo la Linea-Guida "Screening prenatale non invasivo basato sul DNA", quale delle seguenti affermazioni è corretta. Il NIPT può essere effettuato:**

- A. sulle gravidanze gemellari bigemine
- B. sulle gravidanze gemellare bigemine con donazione dei gameti
- C. tutte le altre risposte sono corrette
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**8. Si parla di poliamnios quando l'AFI è**

- A. >15 cm
- B. >20 cm
- C. >25 cm
- D. < 20 cm

**9. L'uovo fecondato arriva in cavità uterina allo stadio di**

- A. morula
- B. zigote
- C. blastocisti
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**10. La ritodrina è:**

- A. un derivato dell'ossitocina
- B. un tocolitico
- C. una tetraciclina
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**11. Nella minaccia di parto pretermine il farmaco tocolitico**

- A. va usato anche in assenza di attività contrattile
- B. è utile prolungarne la somministrazione per più di 48 ore
- C. è raccomandato qualora possano essere effettuati interventi per migliorare gli esiti neonatali
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**12. Nel primo trimestre di gravidanza la produzione di progesterone è data da:**

- A. corpo luteo
- B. corpo luteo gravidico
- C. corpo luteo gravidico e placenta
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**13. A partire da quale epoca gestazionale si può parlare di feto e non più embrione?**

- A. 8W + 1D
- B. 7W + 1D
- C. 10W + 1D
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**14. Nel piede valgo:**

- A. vi è flessione dorsale
- B. il tallone guarda in fuori
- C. il tallone guarda in dentro
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**15. La causa maggiore dell'emorragia post partum (EPP) è:**

- A. lacerazioni ed ematomi
- B. ritenzione di placenta
- C. coagulopatie
- D. atonia uterina

**16. Durante il travaglio e parto in acqua è raccomandato:**

- A. un'assistenza ostetrica one to one
- B. evitare il monitoraggio dei parametri vitali materni
- C. lasciare la coppia in intimità per molto tempo
- D. evitare l'auscultazione del BCF

**17. La temperatura dell'acqua durante il primo stadio del travaglio in acqua deve mantenersi:**

- A. intorno ai 37°C
- B. intorno ai 40°C
- C. intorno ai 32°C
- D. intorno ai 30°C

**18. Quanto misura mediamente la coniugata anatomica?**

- A. 12,5 cm
- B. 12 cm
- C. 10,5-10,8 cm
- D. 11 cm

**19. Nell'attribuzione del punteggio di Apgar non viene preso in considerazione:**

- A. il colorito cutaneo
- B. il riflesso pupillare
- C. la reattività
- D. il tono muscolare

**20. Il secondo stadio del travaglio è il periodo:**

- A. che comprende una fase di latenza ed una fase attiva
- B. compreso tra la dilatazione completa del collo e la nascita del bambino
- C. che comprende il distacco e l'espulsione della placenta
- D. prodromico

**21. Cosa significa l'acronimo CID?**

- A. Coagulopatia ischemica difforme
- B. Chronic intravascular disease
- C. Coagulopatia infettiva diffusa
- D. Coagulopatia intravasale disseminata

**22. Secondo le L.G. sul Taglio Cesareo Parte seconda, nella gravidanza fisiologica per monitorare il benessere fetale durante il travaglio è raccomandata:**

- A. La rilevazione continua del BCF
- B. la rilevazione intermittente solo nel periodo dilatante
- C. la rilevazione intermittente solo nel periodo espulsivo
- D. la rilevazione intermittente sia nel periodo dilatante sia in periodo espulsivo

**23. Il "segno della tartaruga" è tipico di quale condizione ostetrica?**

- A. emorragia post partum
- B. prolacco di funicolo
- C. diabete gestazionale
- D. distocia di spalle

**24. Quali tra questi non è un "fenomeno dinamico" del parto?**

- A. espansione del segmento uterino inferiore
- B. disimpegno della parte presentata
- C. appianamento del collo
- D. distensione del perineo

**25. Se un neonato è classificato alla nascita come LGA vuol dire che ha:**

- A. misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale
- B. misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale
- C. misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**26. Quale tra questi è un criterio di esclusione fetale al travaglio/parto in acqua?**

- A. Polidramnios
- B. feto singolo con presentazione podalica
- C. CTG non rassicurante
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**27. Quale tra questi è un criterio di esclusione materno al travaglio e parto in acqua?**

- A. aspetto del liquido amniotico chiaro
- B. gravidanza singola con presentazione cefalica
- C. preeclampsia
- D. CTG rassicurante

**28. Quale tra le seguenti affermazioni circa l'ittero neonatale è sbagliata?**

- A. ha la medesima incidenza nei neonati a termine e prematuri
- B. rappresenta una condizione clinica molto frequente nei neonati
- C. è una condizione caratterizzata da un cambiamento del colore della cute e delle sclere
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**29. Le complicanze più frequenti dell'iperpiressia nei neonati sono le:**

- A. convulsioni
- B. encefaliti
- C. epilessie
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**30. I "fenomeni plastici" del parto sono fenomeni**

- A. materno-fetali
- B. materni
- C. fetal
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**31. Le anomalie funzionali della dilatazione cervicale non comprendono:**

- A. fase latente prolungata
- B. arresto secondario della dilatazione
- C. ipercinesia uterina
- D. parto precipitoso

**32. L'assunzione di cibo e bevande durante il travaglio è:**

- A. sconsigliata
- B. raccomandata
- C. vietata
- D. obbligata

**33. Nel programma con HPV come test primario, il Pap test eseguito solo nelle donne HPV positive viene definito:**

- A. 'Pap test di Triage'
- B. 'Pap test di screening'
- C. Pap-Test primario
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**34. Il piano superficiale del perineo, anteriormente è occupato dai muscoli:**

- A. Sfintere esterno dell'ano e bulbocavernoso
- B. Bulbocavernoso, ischiocavernoso e trasverso superficiale del perineo
- C. Ischiocavernoso e trasverso superficiale del perineo
- D. Bulbo cavernoso e ischio cavernoso

**35. Secondo le LG ESGO (2018) nelle pazienti con carcinoma endometrioide a rischio intermedio (stadio I endometrioide, grado 1-2, LVSI negativo), la brachiterapia adiuvante è:**

- A. raccomandata per ridurre il rischio della recidiva vaginale (LoE I)
- B. non raccomandata per ridurre il rischio della recidiva vaginale (LoE I)
- C. da valutare in base alle condizioni della paziente
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**36. Nelle donne con sindrome di Lynch il rischio correlato all'insorgenza di tumori maligni dell'endometrio è:**

- A. 30-40%
- B. 40-60%
- C. 60-70%
- D. 70-80%

**37. La vescica è provvista di sfintere:**

- A. interno
- B. esterno
- C. interno ed esterno
- D. l'uretra funge da sfintere

**38. Il diabete gestazionale (GDM) è una ridotta tolleranza al glucosio che :**

- A. compare per la prima volta in gravidanza
- B. permane nei mesi successivi al parto
- C. necessita di terapia medica
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**39. Il monitoraggio clinico nel trattamento con MgSO<sub>4</sub> prevede:**

- A. controllo riflessi rotulei e frequenza respiratoria
- B. controllo diuresi oraria
- C. nessuna delle altre risposte è corretta
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**40. Quale delle seguenti sostanze funge da "antidoto" per le intossicazioni da solfato di magnesio**

- A. nifedipina
- B. adrenalina
- C. calcio gluconato
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**41. Si definisce cronica l'ipertensione :**

- A. che insorge prima della XX settimana di gestazione
- B. che è preestensiva alla gestazione
- C. tutte le altre risposte sono corrette
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**42. Qual è il sintomo più frequente con cui si manifesta il carcinoma endometriale?**

- A. emorragia
- B. dolore
- C. menometrorragia
- D. nausea

**43. Secondo il dossier " Disordini ipertensivi in gravidanza " dell'Istituto Superiore di Sanità:**

- A. qualsiasi donna con PA sistolica  $\geq$  160mmHG o diastolica  $\geq$  110 mmHg deve ricevere un farmaco antipertensivo entro 10 minuti
- B. qualsiasi donna con PA sistolica  $\geq$  160mmHG o diastolica  $\geq$  110 mmHg deve ricevere un farmaco antipertensivo entro 20 minuti
- C. qualsiasi donna con PA sistolica  $\geq$  160mmHG o diastolica  $\geq$  110 mmHg deve ricevere un farmaco antipertensivo entro 15 minuti
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**44. La pluriparietà è un fattore di rischio per l'incontinenza urofcale:**

- A. solo nei parto spontanei
- B. solo nelle cesarizzate
- C. sia nei parto spontanei che nelle cesarizzate
- D. non è un fattore di rischio

**45. Un'ostetrica, come realizza attività di prevenzione oncologica?**

- A. attraverso interventi educativi sulla popolazione femminile nelle diverse fasce di età e condizioni sociali e sanitarie
- B. attraverso la preparazione ed assistenza ad interventi chirurgici per patologie neoplastiche
- C. facendo, solo, una cognizione della popolazione del proprio territorio sanitario
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**46. Il glucosio è presente nelle urine quando la sua concentrazione plasmatica è:**

- A. maggiore di 180 mg/ dl
- B. maggiore di 150 mg/dl
- C. minore di 180 mg/ dl
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**47. Secondo la Direttiva Europea 2005/36/CE (art. 42), gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all'esercizio delle seguenti attività:**

- A. effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale
- B. assistere la partoriente in travaglio e praticare il parto normale (compresa se necessario l'episiotomia e in caso di urgenza il parto podalico)
- C. accettare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**48. Secondo le raccomandazioni O.M.S. sulla qualità dell'assistenza prenatale per un'esperienza positiva di gravidanza (2016) tra gli interventi del sistema sanitario, per migliorare l'uso e la qualità dell'assistenza prenatale, è raccomandato:**

- A. effettuare una valutazione clinica senza assegnare uno specifico profilo assistenziale
- B. aumentare il numero dei tagli cesarei
- C. per la donna in gravidanza, modelli di continuità assistenziale a conduzione ostetrica
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**49. Secondo l'art. 18 della L.194/78 chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con:**

- A. reclusione da quattro a otto anni
- B. reclusione da due a quattro anni
- C. reclusione da uno a tre anni
- D. reclusione da due a sei anni

**50. Secondo il D.M. 24.04.2000, il Consultorio Familiare, è definito un importante strumento, all'interno del Distretto per attuare gli interventi previsti a tutela:**

- A. della salute della donna più globalmente intesa e considerata nell'arco dell'intera vita
- B. della salute dell'età evolutiva e dell'adolescenza
- C. delle relazioni di coppia e familiari
- D. tutte le altre risposte sono corrette

