

# QUESTIONARIO

# 6


## **REGIONE ABRUZZO AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 2 Collaboratori Professionali Sanitari - Personale Infermieristico - OSTETRICA - cat. "D"

### **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova

#### **VERSIONE QUESTIONARIO**



**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**



# Questionario 06000004

**1. Con la seconda manovra di Leopold è possibile stabilire:**

- A. l'epoca di gravidanza
- B. il livello della parte presentata
- C.** la situazione fetale
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**2. La placenta previa centrale parziale in travaglio ricopre:**

- A.** parzialmente l'Orifizio Uterino Interno
- B. totalmente l'Orifizio Uterino Interno
- C. non ricopre l'Orifizio Uterino Interno
- D. risale lateralmente

**3. Il test combinato o duo test prevede:**

- A. la misurazione della translucenza nucleare
- B. la misurazione della translucenza nucleare in associazione con il dosaggio su siero materno della free- $\beta$ hCG e  $\alpha$ -fetoproteina
- C.** la misurazione della translucenza nucleare in associazione con il dosaggio su siero materno della free- $\beta$ hCG e della PAPP-A
- D. la misurazione della translucenza nucleare in associazione con il dosaggio su siero materno della PAPP-A e InibinaA.

**4. L'esecuzione del tampone vaginale e rettale per la ricerca dello streptococco beta-emolitico è raccomandata a:**

- A. 30 W
- B. 32-34 W
- C.** 36-37 W
- D. 40 W

**5. La diagnosi di placenta previa è essenzialmente:**

- A. di laboratorio
- B.** ecografica
- C. clinica
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**6. Quali delle seguenti opzioni è una metodologia di screening per l'identificazione di feti con difetti di accrescimento:**

- A. palpazione addominale
- B. misurazione distanza sinfisi-pubica
- C.** tutte le altre risposte sono corrette
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**7. L'ecografia office è un'ecografia di:**

- A. primo livello
- B. secondo livello
- C.** supporto alla visita
- D. obbligatoria ad ogni visita

**8. Lo screening prenatale non invasivo per la trisomia 21 deve essere offerto:**

- A. a tutte le pazienti, indipendentemente dall'età materna
- B. solo alle pazienti con età avanzata
- C.** a tutte le pazienti, indipendentemente dall'età materna, dopo essere state adeguatamente informate
- D. alle pazienti a rischio per storia familiare

**9. Nella placenta percreta i villi:**

- A. non invadono il miometrio
- B. invadono parzialmente il miometrio
- C.** invadono tutto il miometrio e oltrepassano la sierosa
- D. invadono l'endometrio

**10. La quantità di liquido amniotico, a termine di gravidanza, definita fisiologica è con AFI di:**

- A. 5 - 8 cm
- B.** 5 - 24 cm
- C. > 25 cm
- D. < 5

**11. La VES fisiologicamente in gravidanza:**

- A. aumenta
- B. diminuisce
- C. rimane invariato
- D. dipende dall'epoca gestazionale

**12. Quanti sono in genere i cotiledoni materni nella placenta a termine?**

- A. 5-10
- B. 10-15
- C. 15-20
- D. 20-25

**13. Lo strato più interno delle membrane amniocoriali è:**

- A. il corion
- B. il sacco vitellino
- C. l'amnios
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**14. Indicare l'affermazione errata sulla vitamina K:**

- A. il suo deficit nel neonato può causare emorragia
- B. ha affinità con i grassi
- C. la sua produzione da parte dei batteri intestinali di solito soddisfa il fabbisogno dei neonati
- D. utilizzata come profilassi dell'emorragia

**15. I "fenomeni dinamici" del parto sono modificazioni:**

- A. dei rapporti fra fetto e canale da parto per effetto delle contrazioni
- B. della forma della parte presentata durante il passaggio nel canale da parto
- C. delle parti molli del canale del parto
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**16. Nella presentazione di vertice qual è l'indice fetale?**

- A. fontanella lambdoidea
- B. fontanella triangolare
- C. tutte le altre risposte sono corrette
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**17. Il riflesso di suzione nel neonato può essere stimolato toccando:**

- A. il palato molle o il faringe posteriore
- B. leggermente la punta del naso con un rapido movimento verso l'alto
- C. la cute della guancia o dell'angolo della rima bucale
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**18. Durante il primo stadio del travaglio in acqua è importante:**

- A. monitorare la temperatura dell'acqua
- B. monitorare il BCF con auscultazione ad intermittenza
- C. monitorare la FC materna ogni 2 ore
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**19. I "fenomeni plastici" del parto sono modificazioni:**

- A. modificazioni delle parti molli del canale del parto
- B. tutte le risposte sono corrette
- C. dei rapporti fra fetto e canale da parto per effetto delle contrazioni
- D. della forma della parte presentata durante il passaggio nel canale da parto

**20. L'emorragia post partum viene definita secondaria quando:**

- A. insorge nelle prime 24 ore dopo il parto
- B. insorge tra le 24 e le 72 ore dopo il parto
- C. insorge dopo le 72 ore
- D. insorge tra le prime 24 ore e 12 settimane dopo il parto

**21. Secondo le L.G. sul Taglio Cesareo Parte seconda, l'ammissione al travaglio deve essere offerta alle donne:**

- A. che hanno già partorito mediante TC
- B. con pregressa incisione uterina longitudinale
- C. che hanno già partorito mediante TC , in assenza di controindicazioni specifiche
- D. mai, il TC va sempre ripetuto dopo il primo

**22. Individuare il materiale non necessario per l'intubazione tracheale del neonato:**

- A. laringoscopio con lame rette e curve di misure diverse
- B. pinza di Magill di misura opportuna
- C. soluzione fisiologica
- D. cannula di Guedel

**23. Per valutare il livello della parte presentata qual è il punto di riferimento materno?**

- A. sacro
- B. coccige
- C. spine ischiatiche
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**24. Indicare quale delle seguenti condizioni è frequentemente associata all'oligoidramnios:**

- A. agenesia renale
- B. atresia duodenale
- C. idrope fetale
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**25. Quale tra questi è un criterio di inclusione al travaglio e parto in acqua?**

- A. feto singolo con presentazione cefalica
- B. feto singolo con presentazione podalica
- C. CTG poco rassicurante
- D. emorragia in atto

**26. Gli studi dimostrano che l'immersione in acqua durante la prima fase del travaglio:**

- A. riduce in maniera significativa l'uso di analgesia epidurale/spinale
- B. aiuta il movimento della donna
- C. riduce la percezione del dolore della contrazione
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**27. La placenta "incarcerata" o "intrappolata" è:**

- A. una placentazione anomala invasiva
- B. una placenta aderente alla parete uterina ma separabile manualmente
- C. una placenta che si è staccata completamente dall'utero, ma non è stata espulsa spontaneamente
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**28. Indicare una caratteristica non presente nelle decelerazioni precoci:**

- A. hanno un rapporto temporale preciso con la contrazione
- B. l'acme coincide con l'acme della contrazione
- C. l'acme non coincide con l'acme della contrazione
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**29. Nel lattante si deve praticare la ventilazione:**

- A. bocca-bocca-naso
- B. bocca-bocca, in iperestensione
- C. bocca-naso, in iperestensione
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**30. In presenza di placenta ritenuta senza sanguinamento, dopo 30 minuti si raccomanda di:**

- A. esercitare una trazione sul funicolo
- B. somministrazione di routine di ossitocina
- C. attendere altri 30 minuti oltre i primi 30 intercorsi dall'espulsione del feto
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**31. Cosa si intende con il termine acrocianosi?**

- A. disturbo circolatorio cronico che colpisce l'estremità degli arti
- B. colorazione violacea della zona temporale
- C. tutte le altre risposte sono corrette
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**32. Ad una donna in travaglio attivo con infusione ossitocica in corso:**

- A. è importante farla rimanere digiuna
- B. è necessario valutare il BCF ad intermittenza
- C. non può essere proposta l'immersione in acqua
- D. è raccomandato effettuare visite vaginali ogni ora

**33. L'incontinenza urinaria può essere:**

- A. da sforzo
- B. da urgenza
- C. mista
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**34. Ogni programma di screening va sottoposto a un rigoroso controllo di qualità che assicuri che:**

- A. il referto venga consegnato non oltre le 6 settimane dall'esecuzione del test
- B. il referto venga consegnato non oltre le 4 settimane dall'esecuzione del test
- C. il referto venga consegnato non oltre i 2 mesi dall'esecuzione del test
- D. il referto venga consegnato non oltre le 10 settimane dall'esecuzione del test

**35. L'episiotomia è un fattore di rischio per l'incontinenza uro fecale:**

- A. solo nelle primipare
- B. solo nelle pluripare
- C. è comunque un fattore di rischio
- D. non è un fattore di rischio

**36. Cosa si intende con il termine menometrorragia?**

- A. mestruazione assente
- B. sanguinamento uterino prolungato o eccessivo, irregolare e più frequente del normale.
- C. flusso mestrale normale
- D. flusso mestruale scarso

**37. La riabilitazione del piano perineale è praticabile:**

- A. a tutte le donne che ne hanno bisogno
- B. solo dopo il parto
- C. solo in età post menopausale
- D. solo prima della gravidanza

**38. La chemioterapia neoadiuvante del carcinoma endometriale, si effettua:**

- A. dopo l'intervento chirurgico
- B. durante l'intervento chirurgico
- C. prima dell'intervento chirurgico
- D. terapia del follow up

**39. L'aponeurosi è una struttura**

- A. che contribuisce alla chiusura dello sfintere anale
- B. che contribuisce alla chiusura dello sfintere uretrale esterno
- C. che contribuisce alla chiusura dello stretto inferiore del bacino
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**40. Rientra tra le competenze dell'ostetrica, prestare assistenza pre, intra e post operatoria nei percorsi assistenziali e negli interventi correlati alle patologie benigne ed oncologiche dell'apparato ginecologico?**

- A. No, solo in caso di urgenze
- B. Sì, rientra tra le sue competenze
- C. No, solo se non presenti altre professioni sanitarie
- D. Solo se disposto dal Direttore di U.O.

**41. In una donna affetta da endometriosi possono verificarsi tutti i seguenti sintomi tranne:**

- A. dispareunia profonda
- B. dismenorrea
- C. mastodinia
- D. perdite ematiche

**42. La sorveglianza sanitaria delle pazienti trattate per carcinoma dell'endometrio deve avvalersi prevalentemente:**

- A. di un'accurata anamnesi volta alla ricerca di sintomi suggestivi di ricaduta ed esame clinico e pelvico
- B. dosaggio markers tumorali
- C. indagini per imaging (RMN-TAC)
- D. ecografia trans-vaginale

**43. Una vescica adulta ha una capacità media di contenere:**

- A. circa 200 cc di urine
- B. circa 300 cc di urine
- C. circa 400 cc di urine
- D. circa 500 cc di urine

**44. La scheda di accompagnamento del test (pap test o test HPV) dovrebbe contenere una sigla che identifichi l'operatore che ha effettuato il prelievo, per quali ragioni?**

- A. la registrazione del dato consentirà il controllo di qualità del prelievo per prelevatore che ogni centro di screening dovrebbe effettuare periodicamente
- B. la registrazione del dato permetterà di identificare il prelevatore, interessato in seguito alla consegna del referto
- C. la registrazione è utile per stabilire carichi di lavoro del Centro
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**45. Tutte le seguenti sono complicanze della pre-eclampsia, tranne:**

- A. IUGR
- B. insufficienza renale
- C. ipoglicemia
- D. trombocitopenia

**46. I fattori di rischio legati allo sviluppo di neoplasie dell'endometrio possono essere distinti in diverse categorie, tra cui:**

- A. fattori genetici e coportamentali
- B. fattori ambientali, ormonali, ereditari familiari
- C. fattori ormonali e sistematici
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**47. Nei centri nascita "alongside" o Areee a gestione autonoma BRO, le donne sane con gravidanza a basso rischio possono essere seguite sul territorio dalla figura professionale dell'ostetrica che si avvale dell'integrazione con il ginecologo**

- A. sulla base di protocolli per la definizione del rischio condivise
- B. sulla base di griglie di definizione del rischio condivise
- C. tutte le altre risposte sono corrette
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**48. I Consultori Familiari, sono stati concepiti come servizi "a bassa soglia", perché devono essere:**

- A. visibili e facilmente accessibili da quei gruppi di popolazione a rischio
- B. strutture con minor dispendio di risorse economiche
- C. servizi territoriali con minor impatto in termini di risorse umane
- D. accessibili e limitati ad un'utenza femminile ed in età produttiva

**49. In quale Piano Sanitario Nazionale l'area materno infantile è stata inserita tra quelle prioritarie?**

- A. 1998-2000
- B. 1997-1999
- C. 1999-2001
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**50. "Ad ogni donna deve essere assicurato, nell'ambito dell'organizzazione regionale delle cure, un idoneo percorso che le consenta di accedere con facilità al livello di cura più adeguato e completo al suo caso" si tratta di un principio ispirato dal documento:**

- A. PSN 1997/1999
- B. P.O.M.I D.M. n.89/ 24/04/2000
- C. D.Lgs. 81/2008
- D. D.M. 70/2015

