

## QUESTIONARIO



7

**REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE  
TERAMO**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione  
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 2  
Collaboratori Professionali Sanitari - Personale  
Infermieristico - OSTETRICA - cat. "D"

**NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga  
dato il segnale di inizio della prova

**VERSIONE QUESTIONARIO**

**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**



# Questionario 07000003

**1. Il termine "funneling" si riferisce:**

- A. all'orificio uterino interno
- B. all'orificio uterino esterno
- C. al segmento uterino inferiore
- D. al fondo uterino

**2. La misurazione dell' AFI è data dalla somma delle misurazioni di:**

- A. 2 tasche di L.A.
- B. 3 tasche di L.A.
- C. 4 tasche di L.A.
- D. 5 tasche di L.A.

**3. Il segno di Piskaczek è:**

- A. una deformazione dell'utero in corso di GEU
- B. un rammolimento del collo dell'utero in gravidanza
- C. un'apparente deformazione dell'utero nelle prime settimane di gravidanza
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**4. L'assunzione di acido folico è raccomandata per ridurre il rischio di:**

- A. parto pretermine
- B. difetti cardiaci fetaли
- C. difetti di chiusura del tubo neurale
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**5. In caso di gravidanza gemellare biconiale l'amniocentesi:**

- A. dev'essere praticata in ambedue le cavità amniotiche
- B. essendo una gravidanza biconiale si ha un'unica cavità amniotica
- C. non deve essere mai effettuata perché troppo rischiosa
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**6. Per essere affidabile il risultato del NIPT deve essere ottenuto a partire da una percentuale di DNA fetale libero:**

- A. non inferiore al 10%
- B. non inferiore al 15%
- C. non inferiore al 4%
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**7. Nella misurazione della translucenza nucleare la lunghezza minima vertice - sacro deve essere di :**

- A. 30 mm
- B. 45 mm
- C. 60 mm
- D. 84 mm

**8. La via di somministrazione dell'atosiban è::**

- A. intradermica
- B. intramuscolare
- C. endovenosa
- D. vaginale

**9. Come si utilizza la Regola di Johnson?**

- A. lunghezza SF + (11 o 12 o 13 a seconda dell'impegno della PP) X 155
- B. lunghezza SF - (11 o 12 o 13 a seconda dell'impegno della PP) X 155
- C. lunghezza SF - (11 o 12 o 13 a seconda dell'EG ) X 155
- D. lunghezza SF - (11 o 12 o 13 a seconda dell'EG ) X 155

**10. Il distacco intempestivo di placenta normalmente inserita riconosce come causa principale e predominante:**

- A. ipertensione arteriosa
- B. traumi materni
- C. gravidanza plurima
- D. uso di ossitocini

**11. Il prelievo dei villi coriali permette di effettuare:**

- A. analisi del DNA per la diagnosi delle malattie metaboliche non congenite
- B. analisi del DNA per la diagnosi delle malattie cardiovascolari non congenite
- C. analisi del DNA per la diagnosi delle malattie neurologiche non congenite
- D. analisi del DNA per la diagnosi delle malattie ereditarie

**12. La reazione acrosomiale riguarda:**

- A. l'ovocita
- B. lo spermatozoo
- C. l'embrione
- D. feto

**13. Il cordone ombelicale è rivestito in tutta la sua lunghezza da:**

- A. amnios
- B. corion
- C. gelatina di Wharton
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**14. La pPROM è la rottura delle membrane che avviene:**

- A. in travaglio
- B. < 35 W
- C. < 37 W
- D. > 37 W

**15. Indicare la via di somministrazione più agile e veloce per i neonati nelle prime ore di vita:**

- A. incannulamento vena ombelicale
- B. sottocutanea
- C. rettale
- D. inalazione

**16. Con la manovra di Zangemeister si può valutare:**

- A. la dilatazione cervicale
- B. la coniugata ostetrica
- C. la sproporzione feto-pelvica
- D. la situazione fetale

**17. Quali tra le seguenti possono essere conseguenze della rosolia congenita?**

- A. cardiopatia
- B. sordità
- C. tutte le altre risposte sono corrette
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**18. In caso di ostruzione delle vie aeree nel lattante (dal mese compiuto all'anno di vita), quanti colpi interscapolari bisogna applicare per tentare di disostruire le vie aeree?**

- A. 2
- B. 5
- C. 3
- D. 1

**19. Il termine "sbarramento degli arti superiori" a quale condizione ostetrica è riconducibile?**

- A. distocia di spalle
- B. presentazione di spalla
- C. parto gemellare
- D. parto podalico

**20. I rischi materni e perinatali del travaglio/parto in acqua:**

- A. sono noti e supportati dagli studi
- B. riguardano soprattutto gli esiti avversi neonatali
- C. non sono stati studiati sufficientemente né per supportare né per scoraggiare la richiesta
- D. riguardano soprattutto gli esiti avversi materni

**21. Nella prima posizione, quando il feto opera la rotazione interna l'occipite ruota verso:**

- A. verso sinistra
- B. verso destra
- C. di 3/4
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**22. L'acromion è l'indice fetale della presentazione di:**

- A. podice varietà natiche
- B. podice varietà piedi
- C. spalla**
- D. asinclitica

**23. Cosa si intende per idrocefalo?**

- A. un'ipertrofia del tessuto cerebrale
- B. un accumulo aumentato di liquor in sede interstiziale
- C. un aumento della quantità di liquor nelle cavità ventricolari**
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**24. Quali elementi vanno valutati nell'auscultazione intermittente del BCF in travaglio di parto?**

- A. frequenza cardiaca fetale, contrazioni uterine, movimenti fetali
- B. frequenza cardiaca fetale, frequenza cardiaca materna, movimenti fetali
- C. frequenza cardiaca fetale, contrazioni uterine, frequenza cardiaca materna**
- D. frequenza cardiaca fetale, contrazioni uterine, frequenza cardiaca materna, movimenti fetali**

**25. Le strutture che pianificano di offrire l'immersione in acqua?**

- A. devono essere dotate di protocolli rigorosi e specifici
- B. il personale ostetrico deve essere istruito ed aggiornato
- C. devono selezionare le candidate secondo protocolli rigorosi e specifici**
- D. tutte le altre risposte sono corrette**

**26. Secondo le "Raccomandazioni dell'OMS sulle cure intrapartali" la durata della fase attiva nelle primigravide generalmente non supera:**

- A. le 6 ore
- B. le 8 ore
- C. le 10 ore
- D. le 12 ore**

**27. Nella prevenzione delle lacerazioni perineali bisogna:**

- A. rispettare i tempi fisiologici del periodo espulsivo**
- B. a dilatazione non completa incoraggiare la spinta
- C. usare la manovra di Kristeller
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**28. Le distocie del canale molle non comprendono:**

- A. alterazioni del collo uterino
- B. fibromi
- C. alterazioni di vagina e perineo**
- D. stenosi dello stretto superiore**

**29. I segni di rottura d'utero intrapartum possono includere:**

- A. arresto o mancata coordinazione delle contrazioni
- B. anello di Bandl patologico
- C. apprezzamento delle piccole parti fetal al di fuori dell'utero**
- D. tutte le altre risposte sono corrette**

**30. Nel parto precipitoso la velocità della dilatazione cervicale è:**

- A. > 2 cm/h
- B. > 3 cm/h
- C. > 5cm/h**
- D. < 5 cm/h

**31. L'utilizzo dell'acqua in travaglio:**

- A. aumenta la pressione arteriosa
- B. diminuisce l'impiego dell'analgesia epidurale/spinale**
- C. aumenta il rischio di lacerazioni vagino-perineali
- D. limita la libertà di movimento della donna

**32. Il rapporto tra compressioni e ventilazioni nel neonato è:**

- A. 3:1 - 90 compressioni e 30 ventilazioni al minuto**
- B. le compressioni devono essere continue
- C. 2:1 20 compressioni e 10 atti respiratori**
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**33. La linfoadenectomia, secondo LG ESGO (2018) comporta vantaggi rispetto alla sola isteroannessectomia nelle pazienti con adenocarcinoma endometrioidi in classe di rischio basso stadio I ?**

- A. non si dispongono di evidenze per confermare tale esito
- B. in questi casi, la linfoadenectomia deve essere presa in considerazione
- C. resta al giudizio del clinico definirne l'indicazione chirurgica
- D. in questi casi, la linfoadenectomia non deve essere presa in considerazione

**34. Secondo la LG AIPE 2013, quali dei seguenti farmaci trova impiego nel trattamento dell'ipertensione cronica nel primo trimetre di gravidanza?**

- A. Metildopa
- B. Labetalolo
- C. Nifedipina
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**35. Normalmente il bacino di utenza di un programma di screening cervicale dovrebbe comprendere:**

- A. non meno di 400 mila abitanti
- B. non meno di 250 mila abitanti
- C. non meno di 100 mila abitanti
- D. non meno di 500 mila abitanti

**36. Qual è il trattamento farmacologico routinario utilizzato per la eclampsia?**

- A. Naloxone
- B. Solfato di magnesio
- C. Diazepam
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**37. Il nucleo fibroso è situato:**

- A. tra l'ano e la vulva
- B. tra la vulva e il meato urinario
- C. posteriormente all'ano
- D. sotto la vescica

**38. La terapia del diabete gestazionale è**

- A. solo dietetica
- B. solo farmacologica
- C. dietetica e/o farmacologica
- D. non necessita di terapia ma solo controlli

**39. Lo screening per il carcinoma della cervice uterina è uno strumento in grado di:**

- A. ridurre la mortalità per carcinoma
- B. ridurre l'incidenza della neoplasia invasiva
- C. favorire la diagnosi in una fase in cui il trattamento può essere efficace
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**40. Secondo le L.G. nazionali sul Taglio Cesareo il diabete, gestazionale e non:**

- A. rappresenta una indicazione assoluta al TC
- B. è sconsigliato il parto spontaneo
- C. non rappresenta di per sé una indicazione al TC
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**41. Quali tra le seguenti affermazioni riguardanti la gestione delle pazienti con ipertensione gestazionale lieve non è corretta**

- A. la maggior parte delle pazienti con ipertensione gestazionale lieve può essere gestita in regime extra-ospedaliero
- B. il "bed rest" deve essere raccomandato nelle gravidanze complicate da ipertensione gestazionale lieve
- C. la via vaginale è la modalità di espletamento del parto preferibile nelle pazienti con ipertensione gestazionale lieve
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**42. Il perineo ha un comportamento:**

- A. attivo durante il parto, la defecazione e la minzione
- B. non è attivo durante il parto la defecazione e la minzione
- C. è attivo solo durante il parto
- D. è attivo solo per la defecazione

**43. Quali possono essere condizioni cliniche predisponenti l'insorgenza della neoplasia dell'endometrio?**

- A. menarca precoce
- B. menopausa tardiva
- C. nulliparità
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**44. E' fisiologico perdere le urine:**

- A. non è mai fisiologico
- B. solo dopo il parto
- C. solo in menopausa
- D. solo in gravidanza

**45. Che cos'è il piano perineale:**

- A. è l'insieme di tessuti molli, muscoli e fibre che chiude il bacino nel suo distretto inferiore
- B. è la parte inferiore del muscolo diaframmatico
- C. è un tessuto unico che sorregge la vescica
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**46. Nella stadiazione chirurgica del carcinoma endometriale, l' approccio laparoscopico offre risultati equivalenti rispetto all'approccio laparotomico in termini di ripresa di malattia?**

- A. offre risultati equivalenti in termini di arresto di malattia con ridotte complicanze intra- e post-operatorie
- B. offre risultati differenti con ridotte complicanze intra- e post-operatorie
- C. offre risultati equivalenti in termini di ripresa di malattia con ridotte complicanze intra- e post-operatorie
- D. non esiste una conclusività delle evidenze per confermare tale esito

**47. Tra gli ambiti di competenza consultoriale, rientra l'assistenza in gravidanza che può concretizzarsi attraverso tutte queste azioni, tranne:**

- A. colloqui informativi sulla gravidanza
- B. corsi di preparazione al parto, alla nascita, al ruolo genitoriale
- C. non monitorare la crescita ed il benessere fetale anche mediante l'indirizzo a prestazioni di tipo strumentale
- D. adozione di cartella ostetrica ambulatoriale orientata da linee guida condivise

**48. Quali possono essere gli ambiti di responsabilità ed autonomia professionale in un ambulatorio sulla gravidanza fisiologica a gestione ostetrica?**

- A. assistenza e gestione del travaglio
- B. assistenza e gestione al parto
- C. assistenza al puerperio fisiologico
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**49. L'obiezione di coscienza esonerà il personale sanitario:**

- A. dall'assistenza conseguente all'intervento di interruzione della gravidanza
- B. dall'assistenza antecedente di interruzione della gravidanza
- C. dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza
- D. da tutte le procedure inerenti l'interuzione di gravidanza

**50. Secondo la L.149/78 a quali Enti compete la promozione e l'aggiornamento del personale sanitario sui problemi della procreazione responsabile, sui metodi anticoncezionali, sull'uso delle tecniche, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza?**

- A. Enti ospedalieri
- B. Università
- C. Regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri
- D. Province ed enti ospedalieri

