

QUESTIONARIO

8


REGIONE ABRUZZO AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 2 Collaboratori Professionali Sanitari - Personale Infermieristico - OSTETRICA - cat. "D"

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario 08000002

1. Che cos'è un farmaco tocolitico?

- A. un eccitante dell'utero
- B. un rilassante dell'utero
- C. un antibiotico
- D. un antimicotico

2. Il cordone ombelicale contiene:

- A. 2 vene e 1 arteria
- B. 2 arterie e 2 vene
- C. 2 arterie e 1 vena
- D. 1 arteria e 1 vena

3. Nella placenta previa centrale il bordo placentare:

- A. dista meno di 2 cm dall' OUE
- B. ricopre l'Orifizio Uterino Esterno
- C. ricopre l'Orifizio Uterino Interno parzialmente o totalmente
- D. dista meno di 2 cm dall' Orifizio Uterino Interno

4. In quale epoca viene effettuato il test combinato

- A. 10 - 14+6 settimane
- B. 11 - 13+6 settimane
- C. 15 - 17 settimane
- D. 10 - 12 settimane

5. Il dosaggio dell'alfa-fetoproteina è effettuato per la ricerca di gestanti portatrici di:

- A. difetti del tubo neurale e cromosomici
- B. difetti del tubo neurale
- C. anomalie cromosomiche
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

6. La sintomatologia della placenta previa è rappresentata principalmente da:

- A. perdita di liquido amniotico
- B. presenza di contrazioni
- C. metrorragia
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

7. Quando è consigliabile eseguire l'amniocentesi?

- A. familiarità per malattie genetiche
- B. precedente figlio affetto da anomalia cromosomica
- C. anomalie strutturali del feto all'esame ecografico di routine
- D. tutte le altre risposte sono corrette

8. Nelle donne in gravidanza asintomatiche lo screening della batteriuria (LG -OMS, 2016) dovrebbe essere eseguito :

- A. tramite urinocoltura
- B. tramite esame delle urine standard
- C. tramite urinocoltura, con campione prelevato da mitto intermedio
- D. tutte le altre risposte sono corrette

9. La sintomatologia caratteristica della placenta previa è:

- A. ipertono e perdite di sangue rosso vivo
- B. ipertono e perdite di sangue rosso scuro
- C. assenza di ipertono e perdite di sangue rosso vivo
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

10. Come si esegue la villocentesi?

- A. in assoluta sterilità
- B. sotto continua guida ecografica
- C. sotto mani esperte
- D. tutte le altre risposte sono corrette

11. Nel periodo ovulatorio il muco cervicale aumenta e modifica le sue caratteristiche grazie all'azione:

- A. crescente degli estrogeni
- B. decrescente degli estrogeni
- C. del progesterone
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

12. Nella placenta increta i villi

- A. non invadono il miometrio
- B. invadono il miometrio
- C. oltrepassano la sierosa
- D. invadono l'endometrio

13. I "segni di certezza" per l'identificazione di una gravidanza:

- A. si riscontrano a livello dell'apparato genitale
- B. sono direttamente collegati alla presenza dell'embrione/feto
- C. si riscontrano al di fuori dell'apparato genitale
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

14. Secondo le L.G. nazionali sul Taglio Cesareo Parte seconda, in caso di TC programmato per presentazione podalica, questo deve essere eseguito:

- A. appena possibile dopo aver effettuato la diagnosi
- B. non prima della 39 W
- C. non prima della 41 W
- D. alla 37 W dopo aver eseguito la profilassi con corticosteroidi

15. Il periodo neonatale va:

- A. dal 1° al 28° giorno di vita
- B. la 1° al 5° giorno di vita
- C. dalla 1^ alla 24^ ora di vita
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

16. Quali fattori di rischio antepartali rappresentano una indicazione alla CTG in continua?

- A. anomalie di durata della gravidanza
- B. restrizione della crescita intrauterina
- C. diabete
- D. tutte le altre risposte sono corrette

17. In caso di emorragia in atto durante il travaglio:

- A. è consigliato mettere la donna in vasca
- B. è sconsigliato mettere la donna in vasca
- C. è consigliato attendere l'arresto dell'emorragia per poi mettere la donna in vasca
- D. è consigliato procedere con l'induzione

18. Nella brevità relativa il funicolo ha una lunghezza

- A. superiore alla norma
- B. inferiore alla norma
- C. normale o superiore alla norma
- D. < 20 cm

19. Quali tra questi non è un" fenomeno meccanico" del parto?

- A. rotazione interna
- B. rotazione esterna
- C. formazione della borsa amniocoriale
- D. riduzione e impegno della parte presentata

20. L'immersione in acqua può essere offerta?

- A. prima della 37^ settimana di gestazione
- B. tra la 37^ e la 42^ settimana di gestazione non complicata
- C. a qualsiasi epoca gestazionale
- D. solo tra la 39^ e la 40^ settimana di gestazione

21. Fanno parte delle distocie meccaniche:

- A. anomalie della contrazione
- B. distocie del canale molle
- C. anomalie della dilatazione
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

22. Se un neonato è classificato alla nascita come AGA vuol dire che ha:

- A. misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale
- B. misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale
- C. misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

23. Secondo le L.G. nazionali sulla Emorragia Post Partum, per emorragia post partum minore si intende una perdita ematica stimata:

- A. < 500
- B. > 1000
- C. > 1500
- D. tra 500 e 1000 ml dopo parto vaginale

24. L'attività uterina espressa in Unità Montevideo deriva da:

- A. intensità X frequenza
- B. ampiezza X frequenza
- C. durata X intensità
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

25. Qual è un fattore di rischio per il prolasso di funicolo?

- A. pluriparità
- B. amniorexi
- C. presentazioni anomale
- D. tutte le altre risposte sono corrette

26. I "fenomeni dinamici" del parto sono fenomeni:

- A. fetali
- B. materno-fetali
- C. materni
- D. tutte le altre risposte sono corrette

27. Nella classificazione dei Tagli Cesarei sec.Robson le classi vengono definite in base a :

- A. parità, numero di feti, presentazione fetale, EG, decorso del travaglio e del parto
- B. parità, presentazione fetale, EG, decorso del travaglio e del parto
- C. parità, numero di feti, presentazione fetale, decorso del travaglio e del parto
- D. numero di feti, presentazione fetale, EG, decorso del travaglio e del parto

28. Nella cardiotocografia (CTG) la variabilità si riferisce:

- A. alla FC materna
- B. alla FC fetale
- C. alle oscillazioni della FC fetale
- D. alle contrazioni

29. L'arresto secondario della dilatazione è l'interruzione della dilatazione:

- A. durante la fase latente
- B. durante la fase attiva e prima della dilatazione completa
- C. a dilatazione completa
- D. nel III stadio del parto

30. Quale tra questi è un criterio di esclusione fetale al travaglio/parto in acqua?

- A. IUGR
- B. feto singolo con presentazione cefalica
- C. BCF rassicurante
- D. aspetto del liquido amniotico chiaro

31. Il deficit di surfactante alveolare provoca:

- A. sindrome da polmone umido
- B. malattia delle membrane ialine polmonari
- C. sindrome da aspirazione massiva di meconio
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

32. Secondo le LG SIGO la sorveglianza materno fetale durante l'induzione al travaglio di parto comprende:

- A. monitoraggio CTG per 60' prima e 30' dopo l'applicazione di farmaci e presidi per la maturazione cervicale
- B. monitoraggio CTG per 30' prima e 40/60' dopo l'applicazione di farmaci e presidi per la maturazione cervicale
- C. auscultazione ad intermittenza in corso di infusione ossitocica
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

33. Cosa si intende per effetto ipertensivo transitorio?

- A. condizione in cui i valori pressori sono $\geq 140/90$ mmHg, ma non confermati dopo riposo o alle misurazioni successive nello stesso controllo medico
- B. condizione in cui i valori pressori sono $\geq 130/90$ mmHg, ma non confermati dopo riposo o alle misurazioni successive nello stesso controllo medico
- C. condizione in cui i valori pressori sono $\geq 135/90$ mmHg , ma non confermati dopo riposo o alle misurazioni successive nello stesso controllo medico
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

34. La percentuale di campioni inadeguati a causa del prelievo non deve superare il 5%. A questo scopo, la percentuale di campioni inadeguati va monitorata:

- A. almeno una volta ogni 6 mesi per ogni prelevatore con formazione se fuori dagli standard
- B. almeno una volta ogni 2 anni per ogni prelevatore
- C. almeno 1 volta all'anno per ogni prelevatore, con aggiornamento per chi non rientri nello standard
- D. almeno una volta per ogni prelevatore senza definire un termine preciso

35. Il dosaggio della glicemia a digiuno deve essere richiesto:

- A. alla prima visita
- B. al II trimestre
- C. solo se ci sono fattori di rischio
- D. solo se il diabete è già diagnosticato

36. Il detrusore è:

- A. il muscolo della vescica
- B. un muscolo del perineo
- C. un legamento dell'utero
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

37. L'ipertensione gestazionale:

- A. insorge dopo la XX settimana di gestazione
- B. insorge prima della XX settimana di gestazione
- C. un'ipertensione precedente l'insorgenza della gravidanza
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

38. L'obesità è un fattore di rischio per l'incontinenza urofocale:

- A. non è un fattore di rischio
- B. solo dopo la menopausa
- C. è un fattore di rischio
- D. solo in gravidanza

39. Le donne con diabete gestazionale hanno un rischio aumentato di sviluppare un diabete di tipo 2

- A. in età avanzata
- B. entro un anno dal parto
- C. entro 5 anni dal parto
- D. non esiste questo rischio

40. Secondo le L.G. nazionali sul Taglio Cesareo in caso di feto stimato > 4500 gr è raccomandato

- A. il TC non prima della 39 W
- B. il TC non prima della 40 W
- C. il TC a partire dalla 38 W
- D. l'induzione del parto a partire dalla 38 W

41. Qual è la stadiazione del tumore dell'endometrio più largamente utilizzata?

- A. Stadiazione FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics)
- B. Stadiazione AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica)
- C. Stadiazione AJCC (American Joint Committee on Cancer)
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

42. La distanza ano-vulvare < 2 cm predispone:

- A. a un danno perineale
- B. impedisce l'episiotomia
- C. a un valore fisiologico
- D. per un parto difficoltoso

43. La lordosi accentuata predispone al prolasso dei genitali e all'incontinenza:

- A. nelle donne in gravidanza
- B. nelle donne anziane post menopausa
- C. nelle donne non in gravidanza
- D. tutte le altre risposte sono corrette

44. E' indicato sottoporsi all'esecuzione di un pap test in corso di mestruazioni?

- A. Si
- B. No. È indicato eseguire il prelievo in assenza di perdite ematiche e almeno tre giorni dopo la fine delle mestruazioni
- C. Non ha importanza
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

45. Quali sono i sintomi più tipici delle fasi più avanzate del carcinoma endometriale?

- A. dolore, leucoxantorreia, nausea e vomito
- B. sonnolenza
- C. vertigini
- D. cefalea e astenia

46. Tra i fattori ambientali, quale risulta essere tra gli elementi più comuni nell'anamnesi patologica delle pazienti affette da carcinoma dell'endometrio?

- A. fumo di sigarette
- B. vita sedentaria
- C. obesità
- D. nessuna delle precedenti

47. Secondo le Linee di indirizzo ministeriali, per la definizione e l'organizzazione dell'assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO), quali modelli possono essere adottati:

- A. centri nascita "alongside"
- B. gestione autonoma BRO all'interno della U.O. di Ostetricia e Ginecologia
- C. aree funzionali BRO
- D. tutte le altre risposte sono corrette

48. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 della L.194/78

- A. quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna
- B. quando le circostanze in cui è avvenuto il concepimento sono un pericolo per la salute psichica della donna
- C. quando siano accertati processi patologici, tra cui rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, con grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
- D. quando sussistono condizioni economiche, sociali o familiari, che non permettono il proseguimento della gravidanza

49. Tra gli obiettivi del secondo trimestre di gravidanza a gestione ostetrica in un ambulatorio a guida ostetrica, rientra:

- A. valutare/accettare l'andamento fisiologico e il rispetto del piano assistenziale
- B. favorire la continuità assistenziale territorio/ospedale
- C. valutazione clinica e assegnazione del profilo assistenziale
- D. tutte le altre risposte sono corrette

50. In quale dei seguenti casi un obiettore di coscienza, è tenuto obbligatoriamente a partecipare, per quanto di sua competenza ad interventi di interruzione volontaria di gravidanza:

- A. solo quando richiesto dalla donna
- B. solo quando il proprio intervento è indispensabile per salvaguardare la vita della donna
- C. solo quando è richiesto dal ginecologo
- D. solo quando è richiesto dal direttore sanitario

