

## QUESTIONARIO


9

**REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE  
TERAMO**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione  
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 2  
Collaboratori Professionali Sanitari - Personale  
Infermieristico - OSTETRICA - cat. "D"

**NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga  
dato il segnale di inizio della prova

**VERSIONE QUESTIONARIO**

**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**



# Questionario 09000001

**1. La regola di Johnson serve per valutare:**

- A. il rischio di un parto pretermine
- B. l'aumento ponderale materno
- C. approssimativamente il peso fetale a 38 W
- D. approssimativamente il liquido amniotico

**2. Quanto tempo impiega generalmente l'embrione a giungere in cavità uterina?**

- A. 1 giorno
- B. 10 ore
- C. 3 - 5 giorni
- D. oltre una settimana

**3. AFI sta per:**

- A. Amniotic Fetal Index
- B. Amniotic Fluid Index
- C. Amniotic Funicle Index
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**4. Il mesoderma rappresenta lo strato dei foglietti embrionali:**

- A. esterno
- B. intermedio
- C. interno
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**5. Nella regola di Naegele quanti mesi vanno sottratti al mese dell'ultima mestruazione?**

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 0

**6. Per misurare il liquido amniotico si utilizza:**

- A. AFI
- B. la misurazione della tasca massima
- C. tutte le altre risposte sono corrette
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**7. Cosa non prevede il test integrato:**

- A. ecografia ostetrica e misurazione translucenza nucleo
- B. dosaggio ematico della PAPP-A
- C. dosaggio ematico dell'estradiolo
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**8. Quale delle seguenti è causa di alti livelli di alfa-fetoproteina alla XVII settimana di gestazione?**

- A. trisomia 18
- B. sindrome di Down
- C. ritardo di crescita intrauterino
- D. anencefalia

**9. Quali sono i rischi legati alla procedura dell'amniocentesi?**

- A. corionamniosite
- B. sepsi materna
- C. lesioni fetal da ago
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**10. Il rischio di isoimmunizzazione materno-fetale da Rh è maggiore in caso di:**

- A. madre Rh+ e padre Rh-
- B. madre plurigravida Rh+ e feto Rh-
- C. madre plurigravida Rh- e feto Rh+
- D. madre primigravida Rh- e feto Rh+

**11. La gravidanza oltre il termine è quella che:**

- A. si protrae oltre la 40 settimana
- B. si protrae oltre la 41 settimana
- C. si protrae oltre la 42 settimana
- D. non esiste

**12. Come si esegue l'amniocentesi?**

- A. inserimento di un ago da 20-22 G per via transaddominale sotto costante sorveglianza ecografica
- B. inserimento di un ago da 20-22 G per via transvaginale sotto costante sorveglianza ecografica
- C. inserimento di un ago da 20-22 G per via transcervicale sotto costante sorveglianza ecografica
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**13. Nel primo trimestre di gravidanza qual è il fabbisogno aggiuntivo di Kcal/die?**

- A. nessuno
- B. 500 Kcal/die
- C. 260 Kcal/die
- D. 70 Kcal/die

**14. Quale tra le seguenti patologie neonatali non è associata ad infezione da rubeovirus in gravidanza?**

- A. cecità
- B. focomelia
- C. sordità
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**15. Quale tra le seguenti opzioni non è una componente dell'indice di Apgar?**

- A. colore della cute
- B. tono muscolare
- C. temperatura corporea
- D. frequenza cardiaca

**16. Secondo le L.G. sul Taglio Cesareo Parte seconda, nelle gravidanze gemellari biconiali/biamniotiche a termine con presentazione cefalica di entrambi i feti si raccomanda:**

- A. il taglio cesareo
- B. il parto spontaneo
- C. il parto spontaneo in assenza di fattori di rischio
- D. il taglio cesareo a 37 W

**17. La patologia nota come "spina bifida" è conosciuta anche con il nome di:**

- A. meningomielocele
- B. meningite
- C. meningocelite
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**18. Qual è la frequenza della presentazione podalica a termine di gravidanza?**

- A. 1%
- B. 2-4%
- C. 10%
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**19. In caso di distocia di spalla quale manovra aumenta i diametri della pelvi?**

- A. manovra di Mc Roberts
- B. manovra di Jacqemier
- C. manovra di Rubin 1
- D. manovra di Rubin2

**20. L'indice di shock ostetrico (ISO) è:**

- A. un parametro utilizzato per valutare lo shock ipovolemico
- B. un indicatore di instabilità emodinamica
- C. utile in caso di EPP maggiore
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**21. Nella presentazione di bregma qual è il diametro di impegno?**

- A. sottoccipito-bregmatico
- B. occipito-frontale
- C. mento-occipitale
- D. bitrocanterico

**22. Indicare qual'è la causa di alti livelli materni di alfa fetoproteina alla 17esima settimana di gestazione:**

- A. sindrome di Down
- B. anencefalia
- C. focomelia
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**23. A parità di stimolo, un neonato percepisce:**

- A. più dolore rispetto alle età successive
- B. meno dolore rispetto alle età successive
- C. lo stesso dolore rispetto alle età successive
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**24. L'emorragia post partum viene definita primaria quando:**

- A. insorge nelle prime 24 ore dopo il parto
- B. insorge tra le 24 e le 72 ore dopo il parto
- C. insorge dopo le 72 ore
- D. insorge tra le prime 24 ore e 12 settimane dopo il parto

**25. Cosa si intende per onfalocele?**

- A. difetto di circolazione dovuto ad anomalie della forma del cordone ombelicale
- B. aplasia della parete addominale nella regione ombelicale
- C. anomalie di chiusura del sacco erniario
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**26. Quale tra i seguenti farmaci trova indicazione nell'emorragia post partum per atonia uterina?**

- A. gemeprost
- B. sulprostone
- C. atosiban
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**27. Cosa si intende per taglio cesareo iterativo?**

- A. ripetuto
- B. programmato
- C. urgente
- D. non necessario

**28. Il caput succedaneo, chiamato anche tumore da parto:**

- A. per la sua risoluzione sono necessari molti mesi
- B. è un'area di edema che si forma tra sottocutaneo e periostio
- C. è favorito da un passaggio molto veloce nel canale del parto
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**29. Se un neonato è classificato alla nascita come SGA vuol dire che ha:**

- A. misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale
- B. misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale
- C. misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**30. Il trattamento elettivo della presentazione di spalla è:**

- A. manovra di Mc Roberts
- B. manovra di Jacqemier
- C. taglio cesareo
- D. applicazione di ventosa ostetrica

**31. Quanto misura mediamente la coniugata ostetrica?**

- A. 12,5 cm
- B. 12 cm
- C. 10,5-10,8 cm
- D. 11,11,5 cm

**32. Quale tra questi è un criterio di inclusione al travaglio e parto in acqua?**

- A. placenta previa
- B. membrane rotte da meno di 24 ore
- C. liquido amniotico tinto M2/M3
- D. infusione ossitocica in corso

**33. Il protocollo dello screening con HPV come test primario affida al risultato del Pap test di triage un ruolo chiave e se questo risulta positivo prevede:**

- A. ripetizione del test HPV a 1 anno e invio in colposcopia in caso di persistenza dell'infezione HPV
- B. colposcopia immediata
- C. ripetizione del test HPV a 2 anni
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**34. Nel caso si sospetti una vaginite per la presenza di un essudato molto abbondante o in caso di perdite ematiche, all'atto dell'esecuzione del prelievo cervicale è:**

- A. consigliabile eseguire solo un prelievo di piccole quantità
- B. possibile effettuare il prelievo prei detersione
- C. consigliabile rimandare il prelievo dopo terapia prescritta dal medico
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**35. Il conteggio piastrinico in presenza di un sospetto di sindrome HELLP deve essere:**

- A. < 120.000
- B. compreso tra 100.000 e 120.000
- C. < 100.000
- D. < 60.000

**36. L'allestimento del vetrino per metodica di Pap test convenzionale prevede che il materiale prelevato dall'endocervice venga strisciato su una parte del vetrino:**

- A. con movimento rotatorio antiorario
- B. da un lato della spatola evitando di sovrapporre il materiale
- C. con movimento rotatorio in senso orario
- D. con piccole toccature

**37. Per ipertensione cronica si intende**

- A. un'ipertensione che insorge tra le 20 e le 25 settimane di gestazione
- B. un'ipertensione precedente l'insorgenza della gravidanza
- C. tutte le altre risposte sono corrette
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**38. Nelle gravidanze complicate da DGM con un buon controllo glicemico non è raccomandato l'espletamento del parto prima:**

- A. della 36 W
- B. della 37 W
- C. della 38 W
- D. della 39 W

**39. I Programmi di screening cervicale sono estesi anche alle donne in gravidanza e le attuali Linee Guida Nazionali dell'Istituto Superiore di Sanità (SNLG) raccomandano l'esecuzione del Pap test:**

- A. non prima della 4° settimana e 6 giorni
- B. nel primo trimestre, entro la 12° settimana e 6 giorni
- C. entro l'14° settimana e 6 giorni
- D. nel secondo trimestre, entro la 16° settimana

**40. I muscoli del perineo insieme ai legamenti e alle fasce aponeurotiche contribuiscono:**

- A. alla statica e alla dinamica della vescica
- B. alla statica e alla dinamica del retto
- C. alla statica e alla dinamica dell'intestino
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**41. Secondo l'AIPE (2013) l'ipertensione gestazionale lieve nelle nullipare ha una frequenza:**

- A. <5%
- B. tra il 6% e il 17%
- C. tra il 20% e il 25%
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**42. Alla nascita le complicanze correlate alla macrosomia fetale sono:**

- A. distocia di spalla
- B. fratture ossee
- C. lesioni del plesso brachiale
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**43. La stipsi ostinata è un fattore di rischio per il prolasso genitale:**

- A. in età menopausale
- B. è comunque un fattore di rischio
- C. post gravidico
- D. solo in presenza di emorroidi

**44. Nel diabete gestazionale il valore della curva da carico di glucosio (OGTT) a 60' è:**

- A. uguale o > 92
- B. uguale o > di 153 mg/dl
- C. uguale o > di 180 mg/dl
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**45. Se la donna nei due giorni precedenti ha effettuato ecografie transvaginali o visite ginecologiche:**

- A. è indicato effettuare tranquillamente il Pap test
- B. è indicato effettuare Pap Test previa detersione del canale cervicale
- C. nessuna delle altre risposte è corretta
- D. non è indicato effettuare esame Pap- test

**46. I dosaggi di glicemia nella OGTT si fanno a :**

- A. basale e a 30' e 60' dopo il carico di glucosio
- B. basale e a 60' e 120' dopo il carico di glucosio
- C. a 30' - 60' e 120' dopo il carico di glucosio
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

**47. Secondo una Revisione Sistematica (Cochrane 2016) l'assistenza alla gravidanza a basso rischio in un ambulatorio a guida ostetrica è risultata correlata a:**

- A. minore numero di episiotomie e nascite strumentali
- B. minore probabilità di parto vaginale spontaneo
- C. aumento parti pre termine
- D. aumento epidurale

**48. La dichiarazione per l'obiezione di coscienza, deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o della casa di cura, anche al:**

- A. Direttore Generale
- B. Direttore di Dipartimento
- C. Direttore Sanitario
- D. Direttore Unità Operativa

**49. Secondo il DM 740/94 (Art.1), le competenze dell'ostetrica, trovano riscontri positivi presso gli ambulatori per gravidanze a basso rischio a gestione ostetrica, perché la stessa:**

- A. conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità
- B. assistenza la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio
- C. partecipa ai programmi di assistenza materna e neonatale.
- D. tutte le altre risposte sono corrette

**50. Secondo L.194/78, la dichiarazione per l'obiezione di coscienza, inherente l'interruzione volontaria di gravidanza, deve essere comunicata entro:**

- A. 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente
- B. qualche ora prima dall'attuazione della procedura di interruzione di gravidanza
- C. il prima possibile
- D. non serve comunicazione formale, basta rifiutarsi di attuarla, dichiarando la propria obiezione

