

QUESTIONARIO

10


REGIONE ABRUZZO AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 2 Collaboratori Professionali Sanitari - Personale Infermieristico - OSTETRICA - cat. "D"

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario 10000007

1. Il rischio di rottura delle membrane post amniocentesi è del:

- A. 1-2%
- B. 5-10%
- C. 10-15%
- D. tutte le altre risposte sono corrette

2. I rischi fetali legati alla placenta previa sono:

- A. emorragia post partum
- B. parto pretermine
- C. macrosomia fetale
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

3. Nel distacco intempestivo di placenta normalmente inserta la sintomatologia è:

- A. dolore associato a perdite ematiche rosso vivo
- B. dolore associato a perdite ematiche rosso scuro
- C. assenza di ipertono e perdite di sangue rosso vivo
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

4. L'amniocentesi si esegue:

- A. con la paziente in posizione laterale sinistra
- B. sotto costante sorveglianza ecografica
- C. senza guida ecografica
- D. tutte le altre risposte sono corrette

5. Secondo le L.G. nazionali sulla gravidanza fisiologica, nelle gravidanze a basso rischio quante visite si devono effettuare durante la gravidanza?

- A. 1 a trimestre
- B. frequenza mensile
- C. non meno di 4
- D. più di 8

6. Il prelievo dei villi coriali viene effettuato:

- A. per via transcervicale
- B. per via transaddominale
- C. sotto guida ecografica continua
- D. tutte le altre risposte sono corrette

7. I Centri che erogano il NIPT test devono:

- A. avere competenze nella diagnosi ecografica;
- B. avere competenza nella diagnosi prenatale;
- C. essere in grado di offrire la consulenza pre-test e post-test
- D. tutte le altre risposte sono corrette

8. Quali delle seguenti affermazioni riguardanti il lo screening prenatale non invasivo basato sul DNA (NIPT) è falsa:

- A. non è un test diagnostico
- B. ogni risultato positivo deve essere confermato con una tecnica invasiva
- C. il test deve essere preceduto da un'ecografia e dalla consulenza pre-test
- D. In almeno il 10% dei casi, il campione acquisito non è idoneo ad essere refertato

9. Quali immunoglobuline passano la placenta?

- A. IgG
- B. IgE
- C. IgM
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

10. I laboratori che eseguono il NIPT (non Invasive Prenatal Testing) test devono:

- A. essere certificati
- B. partecipare a programmi di controllo della qualità, nazionali ed internazionali
- C. essere dotati di personale con competenza specifiche
- D. tutte le altre risposte sono corrette

11. il triplo test prevede:

- A. il dosaggio sierico di a-fetoproteina, hCG ed Estradiolo (uE3)
- B. il dosaggio sierico di a-fetoproteina, hCG
- C. il dosaggio sierico di a-fetoproteina, uE3
- D. il dosaggio sierico di a-fetoproteina, hCG, uE3 e inibina

12. Il foro di Botallo durante la vita fetale mette in comunicazione:

- A. i due atri
- B. i due ventricoli
- C. l'arteria polmonare con l'aorta
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

13. Si parla di liquido amniotico ai limiti inferiori quando l'AFI è

- A. tra 3 e 5
- B. tra 5 e 8
- C. tra 9 e 10
- D. < 5

14. La discinesia uterina è caratterizzata da:

- A. contrazioni deboli
- B. pause prolungate
- C. contrazioni intense e frequenti
- D. incoordinata azione contrattile

15. Cosa si raccomanda di monitorare e documentare in cartella clinica nell'immediato post partum?

- A. parametri vitali
- B. tono uterino e perdite ematiche
- C. la funzione vescicale
- D. tutte le altre risposte sono corrette

16. Il prolusso di funicolo si distingue dalla procidenza in quanto il primo si diagnostica solo:

- A. a membrane integre
- B. a membrane rotte
- C. a parto avvenuto
- D. tutte le altre risposte sono corrette

17. Qual è indice fetale nella presentazione podalica?

- A. natiche
- B. solco intergluteo
- C. sacro
- D. piedi

18. Cosa non bisogna fare in caso di distocia di spalle?

- A. eseguire trazioni della testa fetale
- B. eseguire rotazioni della testa fetale
- C. eseguire la manovra di Kristeller
- D. tutte le altre risposte sono corrette

19. Indicare il periodo entro il quale la fontanella anteriore si chiude:

- A. 2 anni di vita
- B. 3 anni di vita
- C. 1 anno di vita
- D. 6 mesi

20. L'auscultazione intermittente del BCF quando deve essere utilizzata per il monitoraggio del travaglio ?

- A. raramente se travaglio non fisiologico
- B. sempre
- C. di routine per travagli fisiologici
- D. mai

21. Durante l'espulsione in acqua della parte presentata, se la donna si alza:

- A. è necessario reimmergerla subito
- B. è necessario che rimanga fuori dall'acqua per il rischio di gaspino prematuro del neonato
- C. è necessario bagnarle i genitali
- D. è necessario chiamare aiuto

22. L'indice di Bishop serve per la valutazione:

- A. del liquido amniotico
- B. della crescita fetale
- C. delle contrazioni
- D. del grado di maturazione cervicale

23. Cos'è il test di Guthrie?

- A. un test per lo screening della fenilketonuria
- B. un test per lo screening neonatale ormai quasi in disuso
- C. tutte le altre risposte sono corrette
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

24. Cosa prende in considerazione l'indice di Bishop:

- A. le caratteristiche intrinseche della cervice
- B. il livello della parte presentata
- C. le settimane di gestazione
- D. le caratteristiche intrinseche della cervice e il livello della parte presentata

25. I "fenomeni meccanici" del parto sono modificazioni:

- A. modificazioni delle parti molli del canale del parto
- B. dei rapporti fra feto e canale da parto per effetto delle contrazioni
- C. della forma della parte presentata durante il passaggio nel canale da parto
- D. tutte le altre risposte sono corrette

26. Nel decorso clinico del parto si distinguono i periodi:

- A. prodromico, dilatante, espulsivo, del puerperio
- B. prodromico, , espulsivo, del secondamento, del puerperio
- C. prodromico, dilatante, espulsivo
- D. prodromico, dilatante, espulsivo, del secondamento

27. I "fenomeni meccanici" del parto sono fenomeni:

- A. materni
- B. fetal
- C. materno-fetal
- D. tutte le altre risposte sono corrette

28. Secondo le LG SIGO , usando il misoprostolo per l'induzione al travaglio di parto i vantaggi sono:

- A. aumento della durata induzione-parto
- B. probabilità di ottenere un parto vaginale entro 6 ore
- C. sicurezza in caso di PROM
- D. minor tasso di tachisistolia

29. Quali fattori di rischio intrapartali rappresentano una indicazione alla CTG in continua?

- A. durata della fase attiva del I stadio < 12 ore
- B. pregressa cicatrice uterina
- C. emorragia vaginale non significativa
- D. anomalie del BCF all'auscultazione

30. Si definisce fisiologico un travaglio

- A. inserito spontaneamente tra la 37 e la 41 W compiuta
- B. con presentazione di vertice, anamnesi ostetrica negativa
- C. con accrescimento fetale nella norma
- D. tutte le altre risposte sono corrette

31. Nella presentazione di fronte qual è l'indice fetale?

- A. mento
- B. radice del naso
- C. fronte
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

32. Il partogramma è uno strumento:

- A. per registrare il BCF
- B. di verifica del benessere fetale
- C. di registrazione grafica dell'andamento del travaglio
- D. di registrazione grafica dell'andamento del post partum

33. I bisogni prioritari di un paziente durante un attacco eclamptico sono:

- A. respirazione, cure igieniche
- B. respirazione, sicurezza, tutela della privacy
- C. respirazione, tutela della privacy
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

34. Tra i seguenti marcatori tumorali, quale ha una maggiore specificità per un adenocarcinoma uterino?

- A. CA 15-3
- B. CEA
- C. CA 125
- D. PSA

35. Secondo la LG - AIOM (2018), la radioterapia transcutanea adiuvante migliora la sopravvivenza delle pazienti con adenocarcinoma dell'endometrio allo stadio I in classe di rischio intermedio?

- A. non conclusività delle evidenze per confermare tale esito
- B. incrementa la sopravvivenza
- C. non incrementa la sopravvivenza
- D. nessuno delle precedenti

36. I rischi fetali correlati al diabete pregestazionale sono:

- A. macrosomia fetale
- B. malformazioni congenite
- C. morte perinatale
- D. tutte le altre risposte sono corrette

37. L'aggiornamento delle linee guida europee (2015), prevede l'introduzione del test HPV come screening primario per le donne al di sopra dei:

- A. 20-25 anni
- B. 30-35 anni
- C. 35-40 anni
- D. 18-22 anni

38. Quali tra i seguenti presidi terapeutici NON prevede il trattamento dell'ipertensione gestazionale?

- A. anticonvulsorianti
- B. sulfato di magnesio
- C. diuretici
- D. induzione del parto o taglio cesareo

39. Nella procedura di fissaggio del materiale cervicale prelevato è raccomandato di tenere il dispositivo ad una distanza di:

- A. 5-10 cm dal vetrino
- B. 20-30 cm dal vetrino
- C. meno di 5 cm dal vetrino
- D. 15 /20 cm dal vetrino

40. La proteinuria è definita significativa in caso di :

- A. valori $\geq 0,3$ g in una raccolta urinaria completa delle 24h
- B. valori $\geq 0,4$ g in una raccolta urinaria completa delle 24h
- C. tutte le altre risposte sono corrette
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

41. La categorizzazione dei disordini ipertensivi in gravidanza prevede:

- A. 3 categorie
- B. 4 categorie
- C. 2 categorie
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

42. Per la definizione della diagnosi di diabete gestazionale quanti valori della curva da carico di glucosio (OGTT) devono risultare alterati?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. tutti

43. Per il prelievo dall'esocervice è indicato l'utilizzo di:

- A. una spazzolina montata su uno stelo rigido (cytobrush)
- B. una curette
- C. una spatola di Ayre
- D. un'ansa ad unicino

44. Le problematiche del piano perineale nella donna sono di competenza:

- A. ginecologica
- B. urologica
- C. chirurgica
- D. multidisciplinare

45. Secondo le Indicazioni per il prelievo nello screening del carcinoma cervicale (GISCI) la sequenza corretta del Pap Test convenzionale prevede:

- A. prima un prelievo endocervicale
- B. non è necessario seguire una sequenza precisa
- C. una valutazione al momento in base alla collaborazione della paziente
- D. prima un prelievo esocervicale

46. Nelle pazienti con carcinoma endometriale avanzato o metastatico la chirurgia puo' essere presa in considerazione a scopo citoriduttivo?

- A. si, quando è possibile una citoriduzione ottimale
- B. no, mai
- C. si, sempre
- D. nessuna delle altre risposte è corretta

47. Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di interruzione della gravidanza può essere presentata:

- A. da lei personalmente
- B. dal tutore
- C. dal marito non tutore, che non sia legalmente separato
- D. tutte le altre risposte sono corrette

48. L'articolo 37 modifica l'art. 48 del D.Lgs. 206/2007 sull'esercizio dell'attività professionale di ostetrica, anche in un ambulatorio a guida ostetrica, prevede, tra le diverse attività autorizzate che:

- A. le ostetriche possano accettare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza diagnosticata come rischiosa da esse stesse
- B. le ostetriche possano accettare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza ed effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale
- C. le ostetriche possano accettare la gravidanza e definire il rischio delle varie tipologie
- D. tutte le altre risposte sono corrette

49. L'efficacia dei diversi modelli di assistenza alla donna in gravidanza è stata esplorata in una importante revisione sistematica della Cochrane evidenziando che il midwifery-led model determina:

- A. una maggiore soddisfazione delle donne per l'assistenza ricevuta dalle ostetriche
- B. una minore soddisfazione delle donne per l'assistenza ricevuta dalle ostetriche
- C. una maggiore soddisfazione delle donne per l'assistenza ricevuta dai ginecologi
- D. una maggiore soddisfazione delle donne assistite a casa rispetto a quelle in ospedale

50. In Inghilterra, le Birth Centres (Linee Guida NICE) sono:

- A. asili nidi
- B. strutture completamente gestite da ostetriche
- C. punti nascita comunitari
- D. nursery di unità operative

